Antibioprophylaxie en endoscopie digestive au CHSA

Version 2, novembre 2016

L'antibioprophylaxie sera prescrite par le médecin prescripteur de l'examen et sera notée sur le bon d'endoscopie. L'antibioprophylaxie sera réalisée au bloc opératoire dans les 30 mn précédant le geste.

1. Patients à haut risque d'endocardite

- Patient porteur de prothèse valvulaire,
- Antécédent d'endocardite infectieuse,
- Cardiopathie congénitale,
- Transplanté cardiaque développant une valvulopathie

2. Procédures à risque d'endocardite

- Dilatation endoscopique et mise en place de prothèse digestive
  Gastrostomie per *endoscopique (GPE)**,
- Sclérose de varice oesophagienne (SVO),
- CPRE,
- Ponction sous écho-endoscopie à l'aiguille,
- Dilatation endoscopique et mise en place de prothèse digestive,
- Traitement par laser et par *coagulation au plasma argon**

**Procédures réalisées au CHSA*

3. Procédures à faible risque d'endocardite

- *Endoscopies diagnostiques hautes et basses**,
- *Mucosectomie**, *ligature de varice oesophagienne (LVO)**,
- *Polypectomie**

**Procédures réalisées au CHSA*

Cas particulier de la LVO : procédure à haut risque d'infection du liquide d'ascite nécessitant une prophylaxie de 7j par une fluoroquinolone.

4. Situations cliniques

Patient à haut risque d'endocardite **et** Procédures à risque[1]	• Amoxicilline 2g IV dans l'heure qui précède le geste (dose unique) + gentalline (3-5 mg/kg en dose unique), • Si allergie, vancomycine 15 mg/kg en dose unique) + gentalline (3-5 mg/kg en dose unique),
Patient à haut risque d'endocardite **et** Procédures à faible risque[1]	• Amoxicilline 2g IV dans l'heure qui précède le geste (dose unique) + gentalline (3-5 mg/kg en dose unique), • Si allergie, vancomycine 15 mg/kg en dose unique) + gentalline (3-5 mg/kg en dose unique),
Patient sans risque d'endocardite **et** Procédures à risque (GPE, SVO)[2]	• Augmentin© 2g dose unique • Dalacine 600 mg IV + Gentalline 3-5 mg/kg en dose unique
Patient sans risque d'endocardite **et** Procédures à risque faible	Pas d'antibioprophylaxie

1.http://www.sfed.org/sites/sfed.prod/files/documents_sfed/files/recommandations/Atbprophylaxie_endodig_v3.pdf
2. http://www.infectio-lille.com/Antibiotiques/atb-mini-tourcoing.pdf

Rédacteur : Dr Levent Thierry, EMA-CHSA
Validation. Dr Biron Nathalie, gastroentérologie-CHSA.